

Sledovanie príznakov u PSS so suspektným a potvrdením na infekčné ochorenie horných dýchacích ciest (chrípka, COVID-19 ...)

Počet strán: 2

Dátum	RÁNO			OBED		
	MENO Klienta: izba číslo:					
Symptómy	Zistené príznaky	Intervencia	Podpis sestry	Zistené príznaky	Intervencia	Podpis sestry
Smrkanie, kýchanie, šteklenie v nose						
Teplota						
Potenie, triaška, pocit chladu						
Tlak krvi						
Pulz						
Frekvencia dýchania za minútu						
Dýchavica, cyanóza						
Kašel'						
Bolest' hlavy						
Bolesti hrdla						
Bolesti svalov a klíbov						
Bolesti brucha						
Bolesti na hrudníku						
Zmena chuti a čuchu						
Stolica						
Vedomie						
Orientácia						
Saturácia kyslíka v krvi						
Iné:						

COVID-19: Príznaky a diagnostika:

Až 97,5 % pacientov má symptómy do 11,5 dní od [infikovania](#).^[8] Ochorenie sa prejavuje horúčkou, kašľom, slabost'ou, ťažkosťami s dýchaním. Väčšina pacientov má ľahký priebeh, podobný prechladnutiu. Pacienti s ťažším priebehom, so zápalom plúc vyžadujú hospitalizáciu, u niektorých sa rozvinie syndróm akútnej dychovej tiesne – ARDS so zlyhávaním dýchania a nakoniec aj vitálnych funkcií.^[1] Infekciu vírusom SARS-CoV-2 spočiatku nie je možné odlišiť od iných vírusových ochorení, medzi ktoré patrí aj [nádcha](#) alebo [chrípka](#), preto je dôležité zistovať epidemiologické súvislosti. Liečba: Ako v prípade väčšiny vírusových ochorení, účinná liečba zatiaľ nie je známa. [Pacienti sú liečení symptomaticky.](#) (www.wikipedia.org)

ReSocia	Interný dokument odbornej činnosti Sledovanie príznakov u PSS so suspektným a potvrdením na infekčné ochorenie horných dýchacích ciest (chrípka, COVID-19 ...)	Príloha č. 10a Počet strán: 2
----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

Legenda:

- 1) Smrkanie a kýchanie: nie, občas, často
- 2) Teplota: pod 36° hypotermia, od 36 – 36,9°C fyziologická teplota, od 37 – 37,9°C zvýšená teplota, od 38 – 40°C nad 40°C hyperpyrexia (pri horúčke dochádza k zníženiu tlaku a zrýchlenému pulzu)
- 3) Tlak krvi: 120/80, od 140/90 hypertenzia, pod 100/60 hypotenzia
- 4) Pulz: 60-80 fyziologická frekvencia, nad 90 tachykardia, pod 60 bradykardia
- 5) Frekvencia dýchania: normálna frekvencia dýchania 12-20/ min. (eupnoe), nad 20 (tachypnoe – pri zvýšenej teplote), pod 12 - bradypnoe, apnoe – zástava dychu
- 6) Kašeľ: (sledovať závažnosť - mierny, výrazný, dusivý, suchý, vykašliavanie - môže zaškrtnúť viaceru možnosť naraz)
- 7) Bolesť hlavy (mierna, výrazná)
- 8) Bolesť hrdla (áno, nie) – škriabanie v hrdle, bolest pri preítaní
- 9) Bolesť svalov a kĺbov: Nie, áno (mierne, výrazné)
- 10) Bolesti brucha: áno/nie
- 11) Bolesti na hrudníku
- 12) Zmena chuti a čuchu:
- 13) Stolica: normálna, hnačka, obstipácia
- 14) Vedomie: bdelý (v norme), unavený, spavý, výrazná spavosť
- 15) Orientácia: orientovaný v čase, v priestore, v mieste / neorientovaný (dezorientovaný- zmätený)
- 16) Meranie saturácie O2 pulzným oxymetrom; (výsledok - hodnota v = , norma je 98% , alebo 100-95, 94-90, 89-70, pod 70%.

Intervencia: **Podanie liekov** (na teplotu; paralén..., hnačku, príp. horúčka klesne spontánne)= **PL**; **podanie tekutín** = **PT 100ml**(vody, čaj; dbať na pomalý príjem tekutín, aby nedošlo k nadmernej hydratácii; **sledovanie PSS** každé xy hodiny; ak sa stav nezlepší = **S PSS**; **podanie vitamínov** = **PV**, **kontaktovanie všeobecného = lekára** = **KVL**. **intervencia podľa pokynov lekára**

= **IPPL**; infúzna terapia= **IT**, **podávanie nutričnej stravy** =**PNS** **testovanie na COVID – 19** = **T_COVID -19**; **dýchacia gymnastika** (nácvik správnej hygieny dýchacích ciest, fúkanie nosa) = **DG**- **dýchanie proti odporu**, - **odhlieňovacie techniky**, - **fyzikálna** terapia, - **relaxácia** = **R**, **polohovanie** = **P**: Fowlerova poloha (v sede), laterálna poloha pri počiatočných ťažkostiah (na boku); v pokročilom štádiu ochorenia sa využíva pronačná poloha (na bruchu), Simsonova poloha (stabilizovaná poloha) a rôzne spôsoby polohovej drenáže. **Izolácia PSS** = **I PSS**; **Vstup len v ochrannom oblečení** (odev, rúško, rukavice) = **VvOP**; Dezinfekcia izby podľa hygienicko epidemiologického plánu= **DI**, **d' ďalšie intervencie**: starostlivosť o optimálnu vlhkosť a teplotu v miestnosti 20°C, pravidelné vetranie, podávanie vhodných tekutín (ak je zahliený – čaj, minerálka, ovocné šťavy; nevhodné – mlieko, mliečne výrobky – viac zahlieňujú), starostlivosť o dýchacie cesty (edukovať o správnom vykašliavaní sputa), kožu a sliznicu nosa (zabezpečiť dostatok vreckoviek, odstrániť sekréty z nosa, ošetriť okolie nosa), vykonávať poklepovú drenáž na uľahčenie vykašliavania sputa (12 min), nefajčiť, zabezpečiť oddych na posteli, snažiť sa eliminovať strach, starať sa o duševnú pohodu a nerušený spánok PSS, eliminovať úzkosť, hodnotiť stav kože a dodržiavať opatrenia proti vzniku dekubitov, podporovať záujem o uzdravenie

	Meno	Funkcia	Podpis	Dátum	Počet strán
Spracoval:					
Schválil:					
Preveril :					

	Interný dokument odbornej činnosti Sledovanie príznakov u PSS so suspektným a potvrdením na infekčné ochorenie horných dýchacích ciest (chrípka, COVID-19 ...)	Príloha č. 10a Počet strán: 2
----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------